

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE.

ÉDITION DE LA STATION "NORD et PICARDIE"

(NORD - PAS-DE-CALAIS - SOMME - AISNE - OISE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX - B.P. 355 - 62005 ARRAS -
tel 23.09.35

DLP 20-4-79092129

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

Rég. recettes Dir. Dép. Agric.

13, Grand-Place - 62022 ARRAS

C. C. P. LILLE 5701-50

ABONNEMENT ANNUEL

BULLETIN N° 144 du 19 Avril 1979

60 Francs

GRANDES CULTURES

COLZA d'HIVER

MELIGETHES

Les sorties de méligèthes ont été favorisées par les dernières journées chaudes, 14-15 Avril.

Dans le secteur de Picquigny (80) le seuil d'intervention 1 méligèthe par plante au stade boutons accolés (D 1 - D 2) peut être atteint sur quelques parcelles qui nécessitent ainsi une intervention (liste des produits dans notre bulletin N° 143 du 13 Avril 1979).

Le secteur de Poix (80) présente des populations encore faibles.

Le secteur Nord d'Amiens (80) n'est pas encore touché.

Nous ne disposons pas d'informations pour d'autres secteurs que ceux ci-dessus mentionnés.

ARBORICULTURE FRUITIERE

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

On note une très forte augmentation des projections d'Ascospores en nature.

Au cours de la dernière décade, le potentiel de projection a été multiplié par 100.

Nous entrons dans la période critique qui va se poursuivre jusqu'à la fin mai.

Il convient donc d'être très attentif et d'apporter beaucoup de soins aux traitements tout au long de cette période

PUCERONS SUR POMMIERS

Leur présence est signalée un peu partout. Il ne nous a pas encore été possible d'en déterminer l'espèce. On remarque de nombreuses coccinelles. Les auxiliaires sont donc présents et il convient de les préserver en choisissant judicieusement les produits insecticides et en évitant d'employer plus particulièrement les pyrethrinoides: decamethrine (Decis), permethrine (Perthrine), fenvalerate (Sumicidin 10) -

Attendez le prochain bulletin pour intervenir.

.../...

CHENILLES (CHEIMATOBIES) sur POMMIERS ET POIRIERS

Observer soigneusement en les décortiquant les boutons floraux. Le seuil d'intervention est de 5 boutons habités sur 100 contrôlés.

Vous pourrez utiliser l'un des produits suivants :

<u>Produit commercial</u>	<u>Matière active</u>	<u>Dose MA/hl</u>
*	phosalone (ce produit est actif sur chenilles et pucerons)	60 g/hl
Dinlen	diflubenzuron	18,75 g/hl

* plusieurs spécialités commerciales.

L'INGENIEUR D'AGRONOMIE

C.P.P.A.P. N° 533 A.D.

D. CALLU